

# IMPFKALENDER

## FÜR KINDER, JUGENDLICHE UND ERWACHSENE NACH DEN EMPFEHLUNGEN DER SÄCHSISCHEN IMPFKOMMISSION (SIKO)

Stand 01.01.2018

Lebensalter	Impfung gegen
ab 7. Lebenswoche	<b>Rotaviren,</b> 2- bzw. 3-malige Schluckimpfung (je nach Impfstoff)
ab 3. Lebensmonat	Beginn der Grundimmunisierung gegen: <b>Diphtherie (D), Keuchhusten (Pa), Tetanus (T), Haemophilus-influenzae-Typ b (Hib), Kinderlähmung (IPV), Hepatitis B (HBV)</b> (evtl. Hepatitis A und B ab 13. Monat) Kombinationsimpfstoffe bevorzugen, 3 Injektionen <b>Meningokokken B (3.Lebensmonat bis 18.Lebensjahr)</b> <b>Meningokokken C/ACWY</b> (3. Lebensmonat bis 18. Lebensjahr) Aufgrund der aktuellen epidemiologischen Lage sollten die Impfungen bevorzugt mit einem tetavalenten Impfstoff (Serogruppen A, C, W, Y) entsprechend der Alterszulassung erfolgen. <b>Pneumokokken (3. Lebensmonat bis 2. Lebensjahr)</b>
ab 7. Lebensmonat	<b>Virusgrippe (Influenza) jährlich</b>

## Lebensalter

## Impfung gegen

ab 13. Lebensmonat	<b>Masern-Mumps-Röteln (MMR) 1. Impfung</b> Grundimmunisierung gegen: <b>D, Pa, T, Hib, IPV, HBV</b> <b>Pneumokokken, Meningokokken B</b> <b>und Meningokokken C/ACWY</b> vervollständigen <b>Hepatitis A und B,</b> Grundimmunisierung 3 Injektionen, falls nicht im Säuglingsalter mit HBV begonnen, wenn ja, <b>Hepatitis A monovalent impfen (2 Injektionen)</b> <b>Varizellen (Windpocken),</b> zweimalige Impfung (Abstand 3 Monate) für alle Kinder, die nicht an Windpocken erkrankt sind
ab 46. Lebensmonat	<b>Masern-Mumps-Röteln (MMR), 2. Impfung</b>
ab 60. Lebensmonat	<b>Tetanus-Diphtherie-Keuchhusten Auffrischimpfung</b>
10.-26. Lebensjahr	<b>Impfung gegen Humane Papillomaviren (HPV)</b> für alle Mädchen und Frauen <b>Impfung gegen Humane Papillomaviren (HPV)</b> für alle Jungen und Männer 2 oder 3 Injektionen (je nach Impfalter)
ab 11. Lebensjahr	<b>Tetanus-Diphtherie-Keuchhusten</b> <b>Kinderlähmung Auffrischimpfung (Vierfach-Impfung)</b>
über 50 Jahre	<b>Gürtelrose (Herpes zoster), 1 Impfung</b>
über 60 Jahre	<b>Pneumokokken,</b> Wiederholungsimpfung abhängig vom Impfstoff
alle 10 Jahre	<b>Tetanus-Diphtherie-Keuchhusten (Tdpa)</b> <b>Kinderlähmung (IPV),</b> Auffrischungsimpfung (Vierfach-Impfung)

**Bitte holen Sie versäumte Impfungen frühestmöglich nach!**

Einige von der SIKO empfohlene Impfungen (z. B. gegen Meningokokken B, HPV für Jungen und Männer sowie gegen Gürtelrose) sind keine Pflichtleistungen der Krankenkassen.

Bitte fragen Sie bezüglich Kostenübernahme vor der Impfung bei der Krankenkasse nach.